

21. Observation, sur deux  
pierres biliaires tirées d'une  
tumeur au bas ventre.

Une femme de Bellegarde en  
gatinnois, âgée de 74. ans, eut  
une colique hépatique très  
violente qui fut suivie d'une  
jaunisse universelle; elle fut  
soulagée par tous les remèdes  
convenables, tant pour calmer  
les douleurs, que pour faire  
reprandre le cours à la bile. obligée  
de quitter cette mortade dans  
les plus grandes douleurs, ie la  
venis entre les mains d'un  
chirurgien du lieu.

Je me trouvais dans le même  
ARC 48 n° 21



parut l'année d'après, ie m'informay  
d'abord de cette femme, Le chirurgien  
me fit le rapport de ce qui s'étoit  
passé depuis que ie n'auay vu la  
malade. Il me dit qu'à la suite  
de cette colique il s'étoit formé  
une tumeur à l'hypocorde  
droit, que cette tumeur avoit  
augmenté peu à peu, qu'enfin  
il s'étoit formé un abcès qui s'étoit  
ouvert de luy même, et avoit fourni  
beaucoup de matières purulentes  
et bilieuses, que l'évacuation  
de ces matières avoit beaucoup  
soulagé la malade, que l'ouverture  
qui s'étoit faite étoit restée fistule<sup>use</sup>,  
que quand cette fistule se fermoit  
la malade venoit de grandes

douleurs, mais que ces douleurs  
celloient aussitôt que la matière  
retenue reprenoit son issue par  
l'ouverture extérieure.

Cet exposé m'engagea à examiner  
cette maladie. J'appressai  
d'abord une tumeur très considéra-  
ble et très dure, à la partie latérale  
droite de la région ombilicale  
à quelque distance du sinus  
fistuleux, lequel étoit placé  
au côté droit et trois lignes ou  
environ au dessus de l'ombilic,  
cette tumeur avoit six pouces  
de longueur, et comme elle étoit  
beaucoup plus grosse par un bout  
que par l'autre, elle avoit à peu  
près la figure d'une poire placée  
transversalement dans cette



Δ  
c'est la région du ventre. Δ  
dire que <sup>la partie</sup> le fondary ce sinus lequel continuoît  
la plus iusque dans la tumeur ou ie  
grosse sentis un corps solide, i'ouvris cette  
etoit tumeur pour tirer ce corps étrange.  
Du costé de sus obligé de faire l'incision  
des ues suivant la longueur de la tumeur  
la plus et proportionnée a son étendue, c'est  
etroite a dire entrouver par rapport a la  
de cette ligne perpendiculaire du corps.  
de la ligne L'extraction de ce corps fut cependant

blanche difficile a cause de son adhérence  
aux muscles, et ie ne pus le  
détacher qu'en appuyant fortement  
avec la main gauche la partie  
de la tumeur du costé des uestes  
tandis qu'avec la droite ie fis  
divers charlemens et des efforts assez  
considérables, par cette conduite ie  
l'enlevay enfin.

Ce corps étoit de la longueur de quatre  
pouces sur trois de circonférence,  
la couleur étoit d'un jaune sale, la  
surface raboteuse excepte par  
un des bouts où il étoit fort poli,  
l'autre bout au contraire étoit garni  
de petites cavités qui recevoient  
des mammelons charnus lesquels  
formoient son adhérence.

Il ne fut pas difficile de reconnaître  
ce corps pour une concrétion bilieuse  
non seulement parce qu'il se fit  
en même temps beaucoup de bile  
encore fluide et très distincte du  
pus, mais encore par sa légèreté,  
son inflammabilité et la qualité  
sulfureuse.

après l'extraction de cette pierre,  
le vuide qu'elle laissa, joint à



l'écartement considerable des parties  
divisées, me fit appercevoir un  
conduit qui alloit par dessus la ligne  
blanche de droit à gauche vers  
l'autre hypocondre, ou ie tentais  
avec ma sonde un second corps  
étranger. Je prolongei l'ouverture  
que j'avek fait d'abord, ce qui me  
donna la facilité de saisir ce corps  
avec mes pinces; mais comme  
il se trouva plus tendre que le  
premier, ie ne pus le retirer que  
par fragmens.

Ces pierres étant ôtées, ie portay  
une partie des bests de la tumeur  
devenue chirroïde, ie n'attachay  
dans les pensemens à faire fondre  
et suppuer ce qui en restoit, ie trouvoy  
alors leui de chaque appareil

pendant les huit premiers jours  
le pus mêlé de bile, peu à peu la  
source se tarit et la mortade fut  
promptement guérie au bout de  
deux mois.


De cette observation on doit conclure,  
1.<sup>o</sup> que la veffieule du fût s'est  
enflammée, qu'elle s'est ouverte, que  
cette inflammation s'est communiquée  
de proche en proche à toutes les parties  
qu'entourne le bile à suivre cette route  
et s'est déposée dans l'endroit où  
nous l'avons trouvée.


2.<sup>o</sup> que des concrétions bilieuses  
formées dans ce réservoir auront  
fait le même chemin, que la  
bile mêlée avec d'autres matières  
qui couloient continuellement  
dans la fumeur, ont augmenté



ces noyaux par des couches de  
différentes couleurs.

3.<sup>e</sup> que l'ouverture de la valvule  
du fil peut se former, malgré  
l'impossibilité d'y porter des remèdes  
comme dans ce cas cy. ~~Il y a~~ <sup>ce qui fut</sup>  
~~l'ouvrage~~ de la nature. Il y a d'autres  
cas qui ressemblent en quelque  
chose à celui<sup>cy</sup>, dans lesquels la  
chirurgie est d'un grand secours,  
surtout lorsqu'il est possible de porter  
des remèdes plus immédiatement  
sur le mal.





douleurs, mais que ces douleurs  
celloient au litot que la maladie  
devenue rapprivoit



